TIPOS DE TRAUMA Y SUS MANIFESTACIONES CLÍNICAS

GUÍA PSICOEDUCATIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL

PSIKOAPRENDE

¿QUÉ ES EL TRAUMA PSICOLÓGICO?

El trauma psicológico es una respuesta emocional a un evento o serie de eventos abrumadores que superan la capacidad de afrontamiento del individuo. La clasificación del trauma permite una evaluación más precisa y un abordaje terapéutico más efectivo.

TRAUMA AGUDO

Respuesta a un evento único, reciente y claramente identificable que ha superado los recursos de afrontamiento.

MANIFESTACIONES:

- Flashbacks e imágenes intrusivas
- Hipervigilancia y sobresalto
- Evitación de estímulos relacionados
- Alteraciones del sueño
- Embotamiento emocional

TRAUMA CRÓNICO

Exposición repetida y prolongada a eventos traumáticos a lo largo del tiempo, generalmente en contextos específicos.

MANIFESTACIONES:

- Disociación frecuente
- Dificultad para regular emociones
- Sentimientos de vacío o desesperanza
- Desconfianza generalizada
- Síntomas somáticos persistentes

TRAUMA COMPLEJO (C-TEPT)

Resultado de trauma interpersonal repetido, especialmente en relaciones donde había un desequilibrio de poder.

MANIFESTACIONES:

- Alteración en la autorregulación
- Alteraciones en la conciencia (disociación)
- Cambios en la autopercepción
- Dificultades en las relaciones
- Somatización y síntomas físicos

TRAUMA DEL DESARROLLO

Experiencias adversas durante la infancia que afectan el desarrollo neurobiológico, emocional y relacional.

MANIFESTACIONES:

- Apego inseguro o desorganizado
- Dificultades en la regulación emocional
- Problemas de autoestima
- Patrones relacionales disfuncionales
- Vulnerabilidad a trastornos mentales

TRAUMA VICARIO / SECUNDARIO

Traumatización indirecta por exposición repetida al sufrimiento de otros, común en profesionales de ayuda.

MANIFESTACIONES:

- Agotamiento emocional (burnout)
- Cambio en la visión del mundo
- Cinismo o desapego profesional
- Intrusiones relacionadas con casos
- Dificultad para mantener límites

TRAUMA TRANSGENERACIONAL


Transmisión del impacto traumático entre generaciones a través de patrones familiares y mecanismos epigenéticos.

MANIFESTACIONES:

- Patrones familiares repetitivos
- Secretos y temas tabú familiares
- Ansiedad sin causa aparente
- Lealtades invisibles
- Duelos no resueltos heredados

SEÑALES DE ALERTA Y CONSIDERACIONES CLÍNICAS

La Ventana de Tolerancia es un concepto desarrollado por el Dr. Daniel Siegel, se conoce especialmente en el tratamiento del trauma. Hace referencia al rango óptimo de activación del sistema nervioso en el que una persona puede manejar sus emociones, pensamientos y experiencias de manera efectiva y adaptativa. Dentro de esta "ventana", la persona puede procesar información, regular sus emociones y responder de manera adecuada a las demandas del entorno.



Componentes de la ventana de tolerancia:

- **Hiperactivación:**
  Se caracteriza por una **respuesta de sobrecarga**. El sistema nervioso entra en un estado de alerta excesiva, lo que lleva a emociones intensas como la ansiedad, hipervigilancia e irritabilidad, con pensamientos acelerados y dificultad para concentrarse o relajarse.
- **Zona óptima:**
  Esta es la **área ideal**, donde la persona está lo suficientemente alerta como para responder a los estímulos, pero sin sentirse abrumada. En esta zona, la persona puede procesar información de manera clara, regular sus emociones con eficacia y responder de forma adaptativa a situaciones estresantes.
- **Hipoactivación:**
  En este estado, la persona experimenta una **desconexión** emocional o física. Puede sentir fatiga, entumecimiento, disociación o tener respuestas enlentecidas, como una forma de intentar protegerse de la sobrecarga emocional.

El trabajo en terapia busca **ampliar la ventana de tolerancia**, ayudando a la persona a regular mejor sus respuestas emocionales y a aumentar su capacidad de estar presente y procesar el dolor de manera saludable, sin caer en respuestas extremas de hiper o hipoactivación.

DINÁMICA DE REGULACIÓN PARA AMPLIAR LA VENTANA DE TOLERANCIA



Objetivo:
Ayudar a la persona a ampliar su ventana de tolerancia a través de técnicas de regulación emocional.

Instrucciones:

1. **Conexión con el cuerpo**
   Pide al paciente que se centre en su respiración. Invite a inhalar profundamente por la nariz y exhalar lentamente por la boca. Realice 3 respiraciones profundas.
   Objetivo: Reducir la activación simpática y facilitar el retorno a la zona óptima.
2. **Observación del entorno**
   Pide al paciente que observa su entorno y nombre tres cosas que pueda ver, oler o escuchar. Esto activa el sistema parasimpático, promoviendo la regulación.
3. **Anclaje en una sensación corporal positiva**
   Pide al paciente que se centre en una sensación corporal positiva (por ejemplo, las manos descansando sobre la mesa, los pies tocando el suelo) y que explore cómo se siente con esa sensación. Esta técnica activa la corteza prefrontal, la cual regula la amígdala (responsable de las respuestas de miedo).
4. **Establecer un "punto de anclaje"**
   Pide al paciente que elija una sensación corporal o una visualización que le ayude a sentirse seguro y centrado (por ejemplo, imaginarse en un lugar tranquilo, sentir el contacto de las manos sobre la superficie). Este será su "punto de anclaje" cuando se sienta fuera de la ventana de tolerancia.

ENFOQUES TERAPÉUTICOS

- EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento)
- TCC Centrada en el Trauma
- Terapia de Exposición Prolongada
- Terapia Sensoriomotriz
- Mindfulness y regulación somática

RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA

1. Establecer seguridad y estabilización antes de procesar el trauma directamente
2. Evaluar la ventana de tolerancia del paciente y ajustar las intervenciones
3. Trabajar a un ritmo que el paciente pueda tolerar (no retraumatizar)
4. Incorporar técnicas de regulación somática y grounding
5. Considerar el contexto relacional y cultural del paciente
6. Practicar el autocuidado profesional para prevenir trauma vicario

PSIKOAPRENDE

Este documento es un recurso educativo de referencia rápida y no sustituye la formación especializada en trauma. Se recomienda supervisión clínica y formación continua para el abordaje de casos complejos.